

Spørgeskema om anvendelse & effekt af PROTAC SenSit og SenSit Puff

Spørgeskemaet er ment som en hjælp til jer for at vurdere effekt af brugen af Protac SenSit stolen. Skemaet tager ca. 5-10 min at udfylde.

Del 1 udfyldes inden afprøvningsstart

Del 2 udfyldes efter afprøvningsperiode

DEL 1

Dato: _____

Afprøvningsperiode: _____

Hvem står for afprøvningen?: _____

Navn på bruger: _____

Alder og evt. diagnose: _____

Hvorfor afprøves stolen til denne person? _____

Skemaet er udfyldt af:

- Brugeren selv Pårørende
 Terapeuten Anden person

1: Hvilken Protac SenSit blev afprøvet:

- Standard Med tunge vinger
 Med høj ryg

2: Årsag til brug af Protac SenSit - hvad skal kuglestolen afhjælpe? Afkryds i alle relevante rubrikker.

- Motorisk uro
 Psykisk uro
 Smerter
 Koncentration/opmærksomhed
 Sociale problemer
 Angst
 Selvskadende adfærd
 Taktil skyhed
 Ufrivillige bevægelser
 Spasticitet

Andet: _____

Del 2

3: Hvor hyppigt er Protac SenSit brugt gennem afprøvningsperioden?

- Dagligt
- Flere gange dagligt
- 1- 3 gange ugentligt
- Sjældnere

Kommentar: _____

4: Hvor længe ad gangen er Protac SenSit blevet brugt?

- 0-20 min.
- 20-40 min.
- 40-60 min.
- Over en time

andet: _____

5: I hvilke situationer er Protac SenSit afprøvet? Afkryds alle relevante muligheder.

- Under fællesaktiviteter
- Til hvile og pauser
- Til samlinger
- Til forberedelse for aktivitet
- Til at berolige
- Ved motorisk uro.

andet: _____

6: Er Protac SenSit brugt sammen med puffen eller hver for sig?

- Sammen
- Hver for sig

Spørgsmålene 7 -19 henviser til din besvarelse i DEL 1, spørgsmål 2. Det er kun nødvendigt at besvare de spørgsmål, der er relevante ift. dine afkrydsninger i spørgsmål 1.

7: Har Protac SenSit dæmpet den motoriske uro?

- Ja
- Nej

Hvis ja, forklar: _____

8: Har Protac SenSit givet psykisk/mental ro?

- Ja
- Nej

Hvis ja, forklar _____

9: Har Protac SenSit afhjulpet smerter?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

10: Har Protac SenSit bedret koncentration/opmærksomhed?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

11: Har Protac SenSit påvirket din evne til at være i blandt andre mennesker?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

12: Har Protac SenSit givet mere tryghed/dæmpet angst?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

13: Har Protac SenSit dæmpet selvskadende adfærd?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

14: Har Protac SenSit dæmpet ubehaget ved berøring/dæmpet taktil skyhed?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

15: Har Protac SenSit nedsat ufrivillige bevægelser?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

18: Har Protac SenSit påvirket graden af spasticitet?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

19: Har Protac SenSit påvirket andet?

- Ja
 Nej

Hvis ja, forklar _____

20: Øvrige kommentarer til brugen af Protac SenSit

Protac håber skemaet har været til støtte i forbindelse med beskrivelse af Protac SenSits anvendelse og effekt.
